

Главному врачу
ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская
поликлиника № 3"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу привить моего ребенка _____
Фамилия, Имя, Отчество ребенка

_____ года рождения
день, месяц, год рождения

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Добровольное информированное согласие прилагается.

Родитель (законный представитель) _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

Дата _____

Информация

несовершеннолетнему (законному представителю несовершеннолетнего)
по вакцине против новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак-М»
(в соответствии с письмом МЗ РФ от 22.12.2021 № 30-4/И/2-21694)

Характеристики вакцин, противопоказания к применению

Комбинированные векторные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак-М» получены биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется.

Препараты состоят из двух компонентов: рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент I) и рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент II).

Показания к применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М»: Профилактика COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно).

Пациенту необходимо знать, что:

- 1) вакцина против COVID-19 не содержит живого вируса и поэтому не приводит к заражению граждан, не может дать положительный результат ПЦР-теста или иного лабораторного теста на определение возбудителя новой коронавирусной инфекции;
- 2) вакцина не вызывает у людей заболевания, а создает иммунный ответ и защищает человека от развития тяжелых форм заболевания;
- 3) вакцинация не исключает возможности заразиться новой коронавирусной инфекцией и передать ее другому человеку, поэтому для защиты других и себя необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе соблюдение дистанции, использование масок, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях;
- 4) наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не влияет на принятие решения о вакцинации, так как, согласно данным международных экспертных сообществ, отсутствуют методы исследований и тест-системы, позволяющие подтвердить взаимосвязь между наличием антител и степенью, и продолжительностью защиты.

Противопоказаниями к применению являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- возраст до 12 лет (для вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Противопоказания для введения компонента II для вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М»:

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°C и т.п.) на введение компонента I вакцины.